

Таблица 4
Динамика исчезновения симптомов заболевания через 2 недели и 1 месяц
лечения препаратом «Экдифит»

Симптомы заболевания	Основная группа		Контрольная группа	
	после лечения, %	через 1 месяц, %	после лечения, %	через 1 месяц, %
Кашель	35 79,5±6,09	19*** 43,2±7,47	42 93,3±3,73	36 80,0±5,96
Выделение мокроты	28** 65,1±7,27	13*** 30,2±7,00	39 92,9±3,95	29 69,0±7,14
Боли в груди	10* 55,6±1,65	3* 16,7±8,79	18 85,7±7,63	11 52,4±10,89
Одышка	15 68,2±9,93	7* 31,8±9,93	19 86,4±7,30	14 63,6±10,25
Повышение температуры	5 26,3±10,1	1 5,3±5,1	10 50±11,18	3 15±7,98
Похудания	14 51,9±9,61	3*** 11,1±6,04	19 76±8,21	14 56±9,92
Слабость	26 70,3±7,51	20 54,1±8,19	32 84,2±5,91	21 55,3±8,06
Снижение аппетита	9** 42,9±10,80	6* 28,6±9,86	21 87,5±6,75	15 62,5±9,88
Плохой сон	4 50±17,68	1 12,5±11,69	4 66,7±19,24	2 33,3±19,24
Потливость	4*** 16,7±7,61	0	14 63,6±9,97	0
Хрипы	15 60±9,80	10 40±9,80	19 79,2±8,28	16 66,7±9,6
Всего	39 84,8±5,29	31 67,4±6,91	43 95,6±3,06	38 84,4±5,50

Примечание - * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$ – достоверность различий параметров между группами после лечения.

Таблица 5
Динамика нормализации показателей периферической крови после лечения
препаратом «Экдифит»

Показатели	Основная группа		Контрольная группа	
	после лечения, %	через 1 месяц, %	после лечения, %	через 1 месяц, %
Эритроциты	5 63,5±17,11	7 87,5±11,69	2 40,0±21,90	3 60±21,90
Гемоглобин	10 55,6±11,71	12 67,7±11,10	4 28,6±12,07	7 50±13,36
СОЭ	15 51,7±9,24	17 58,6±9,15	9 33,3±9,07	12 44,4±9,56
Лейкоциты	10 76,9±11,69	11 84,6±10,01	6 46,1±13,83	8 61,5±13,5
Палочко-ядерные нейтрофилы	3 75±21,65	4 100	2 50±25,0	2 50±25,0
Лимфоциты	14 77,8±9,80	16 88,9±7,40	8 50±25,0	11 68,8±11,58
Всего	20 51,3±8,0	24 61,5±7,79	11 31,3±7,84	18 51,4±8,45

уменьшились. В контрольной группе симптомы заболевания исчезли, соответственно у 6% и 16% пациентов (табл. 4).

Во время клинических испытаний у больных проводилось исследование гемограммы, как до приема препарата «Экдифит», так и после лечения. При сравнении результатов общего анализа крови отмечена нормализация показателей в основной группе после 2 недель лечения у 20 (51,3±8,0%) и через месяц у 24 (61,5±7,79%) испытуемых из 39, имевших патологические изменения в гемограмме. В контрольной группе такие изменения были выявлены, соответственно, у 11 (31,3±7,84%) и 18 (51,4±8,45%) больных из 36 пациентов (табл. 5).

При изучении динамики биохимического исследования крови нормализация общего белка установлена после месяца лечения у 50% больных основной группы и у 25% контрольной группы.

В ходе клинического исследования больным до лечения и через 1-3 месяца после начала испытания препаратом «Экдифит» проводилось исследование мокроты на МТ бактериоскопическим методом. В результате лечения бактериовыделение прекратилось в основной группе у 28 (80,0±6,76%) из 35 больных, выделявших МТ, в контрольной, соответственно у 16 из 32 больных (50,0±8,84%) ($p < 0,01$).

Проведенные повторные рентгенологические исследования свидетельствуют о положительной рентгенологической динамике в виде частичного рассасывания, уплотнения инфильтрации и уменьшения полости распада. В основной группе подобная динамика выявлена у 29 из 32 больных (90,6±5,16%), в контрольной - у 20 из 32 (62,5±8,56%) исследованных.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что препарат «Экдифит» повышает эффективность комплексного лечения туберкулеза легких.

Полный список использованной литературы можно запросить в редакции.